



CAPITAL
DIGESTIVE
CARESM

First in Digestive Health

EZ2GO С ДИЕТОЙ ИЗ ПРОЗРАЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

(Ez2go WITH CLEAR LIQUID DIET PROCEDURE
PLANNING & TIP SHEET)

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТОЯЩЕЙ ПРОЦЕДУРЕ

(YOUR PERTINENT PROCEDURE INFORMATION)

Дата процедуры: _____
(Procedure date)

Время процедуры: _____
(Procedure time)

Время прибытия: _____
(Arrival time)

Место проведения: _____
(Appointment location name)

Адрес места проведения: _____
(Appointment location address)

Имя сопровождающего
при поездке домой: _____
(Name of person providing you a ride home)

Кем приходится пациенту: _____
(Relationship)

Номер телефона: _____
(Phone number)

ПРОЧИЕ УКАЗАНИЯ

- Возьмите с собой удостоверение личности, страховой полис и сумму доплаты (если требуется).
- Наденьте удобную одежду. Не надевайте ювелирные украшения и не берите с собой ценные вещи.
- Не пользуйтесь духами или лосьонами. Дезодорантом пользоваться разрешено.

СПОСОБЫ ОБЛЕГЧИТЬ ПОДГОТОВКУ

- Чтобы избежать раздражения во время подготовки, можно использовать Desitin, Anusol, подушечки Tucks или вазелин для смазывания области прямой кишки.
- Можно пить раствор для подготовки через соломинку или зажимать нос во время питья.
- Если почувствуете тошноту, увеличьте интервал между дозами.
- При рвоте сделайте перерыв, а когда рвотные позывы прекратятся, продолжайте медленно пить раствор.

ЧЕГО ОЖИДАТЬ

- Ожидайте частой дефекации и диареи в течение 1–4 часов. Наберитесь терпения и постараитесь ходить, чтобы стимулировать перистальтику кишечника. Не отходите далеко от туалета. В течение этого времени продолжайте подготовку.
- К концу подготовки стул должен представлять собой бесцветную или желтоватую жидкость.
- Вы должны выпить все дозы раствора для подготовки до конца, даже если стул принял вид прозрачной или желтоватой жидкости уже на ранних этапах процесса.
- Продолжайте пить прозрачные напитки до тех пор, пока до процедуры не останется 3 часа. За 3 часа до процедуры полностью запрещается есть и пить (в т.ч. воду), запрещены даже жевательные резинки и леденцы.
- Процедура может быть отменена в следующих случаях: вы не прошли полную подготовку или прошли ее неправильно (не было прозрачного или желтоватого жидкого стула); вы ели или пили что-либо в течение 3 часов до процедуры.

EZ2GO С ДИЕТОЙ ИЗ ПРОЗРАЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ЗА 1 НЕДЕЛЮ ДО ПРОЦЕДУРЫ

Для колоноскопии или колоноскопии/ЭГДС

ОЗНАКОМЬТЕСЬ ЗА 1 НЕДЕЛЮ ДО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Capital Digestive Care (CDC) имеет множество отделений и центров эндоскопии. Некоторые из них находятся очень близко друг от друга.

- Пациентов центра эндоскопии могут попросить прибыть за 45–60 минут до начала, чтобы пройти мероприятия по регистрации и приему.
- Пациентов стационара могут попросить прибыть на 1–2 часа раньше, чтобы пройти мероприятия по регистрации и приему.

Просим обратить внимание на точное время прибытия, указанное в направляемых вам напоминаниях.



ЛЕКАРСТВА

Расскажите своему врачу обо всех лекарствах и БАДах, которые вы регулярно принимаете. Не прекращайте прием рецептурных препаратов без прямых указаний своего лечащего врача.



ТРАНСПОРТ

К некоторым занятиям, например к вождению автомобиля, разрешается приступить только на следующий день после процедуры. Попросите кого-нибудь (старше 18 лет) отвезти вас домой и позаботиться о вас. Попросите этого человека оставить автомобиль на парковке и зайти в учреждение, чтобы забрать вас после процедуры. Сопровождающий должен прибыть не позднее, чем через 1 час после начала вашей процедуры. Если назначенное время 15:00, ваш сопровождающий должен прибыть не позднее 16:30. Пользоваться услугами такси, Uber, Lyft и т. д. запрещается.



ОТМЕНА

Вы обязаны уведомить об отмене в течение одной (1) недели, в противном случае взимается плата в размере 150 долларов США.

EZ2GO С ДИЕТОЙ ИЗ ПРОЗРАЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ЗА 1 НЕДЕЛЮ ДО ПРОЦЕДУРЫ

Для колоноскопии или колоноскопии/ЭГДС



ЗА 5 ДНЕЙ ДО ПРОЦЕДУРЫ

ОТДЕЛЕНИЕ CAPITAL DIGESTIVE CARE

Возьмите в своем отделении Capital Digestive Care:

- Подготовительный набор eZ2go (35 USD):
- Подготовительные наборы можно забрать с 9:00 до 15:00 с понедельника по пятницу
- В набор входит бутылка порошка MiraLAX весом 238 г, четыре таблетки по 5 мг слабительного «бисакодил» (bisacodyl) и 142 г (5 унций) порошка цитрата магния. Если вы покупаете безрецептурные препараты в аптеке, вместо пакета с порошком цитрата магния приобретите бутылку (300 мл/10 oz) раствора цитрата магния.
- Отдельно купите 1920 мл (64 oz) Gatorade или G2 (но не красного и не оранжевого цвета).
- По желанию: безрецептурные средства для снятия раздражения прямой кишки, которое может возникнуть во время подготовки. Это могут быть Desitin, Anusol, подушечки Tucks или вазелин.
- По желанию: для облегчения подготовки можно смешивать препарат не с водой, а с прозрачными жидкостями, например с прозрачной газировкой (Sprite, имбирный эль) или лимонадом без мякоти.

НЕЛЬЗЯ

- Если вы принимаете добавки, содержащие железо, прекратите их прием за 5 дней до процедуры.
- Если вы принимаете Phentermine, прекратите его прием за 5 дней до процедуры.



ЗА 3 ДНЯ ДО ПРОЦЕДУРЫ

Скорректируйте диету



Исключите продукты с высоким содержанием клетчатки, включая семена, киноа, орехи, бобовые, кукурузу/попкорн, свежие фрукты, свежие овощи и отруби. Ознакомьтесь с листовкой «Планирование процедуры и рекомендации» и узнайте, чего ожидать и как облегчить подготовку.



ЗА 1 ДЕНЬ ДО ПРОЦЕДУРЫ

Этот режим подготовки требует соблюдения диеты, состоящей из прозрачных жидкостей, начиная с момента пробуждения в день накануне дня процедуры. Время начала и завершения подготовки определяется согласно инструкции. **Несоблюдение инструкции может привести к отмене процедуры ради вашей безопасности.**

УПОТРЕБЛЯЙТЕ ТОЛЬКО ПРОЗРАЧНЫЕ ЖИДКОСТИ

После пробуждения важно пить как можно больше прозрачных жидкостей в течение дня, чтобы избежать обезвоживания во время вечерней подготовки.

МОЖНО*

- Вода, яблочный сок, белый виноградный сок, белый клюквенный сок, бульон, чай, кофе (без молока, сливок и их заменителей).
- Желе, итальянский лед, фруктовый лед, газированные воды, Kool-Aid, Gatorade.

*Они не должны быть красного, оранжевого или фиолетового цвета или содержать мякоть фруктов.

НЕЛЬЗЯ

- Жидкости или продукты красного, оранжевого или фиолетового цвета.
- Молоко, сливки или заменители молочных продуктов (например, искусственные сливки, соевое или ореховое молоко).
- Соки с мякотью (например, апельсиновый, грейпфрутовый, ананасовый, томатный и овощные соки) или замороженные соковые продукты, содержащие мякоть.
- Алкогольные напитки.
- Твердая пища.

EZ2GO С ДИЕТОЙ ИЗ ПРОЗРАЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ | ДЕНЬ/ВЕЧЕР НАКАНУНЕ ПРОЦЕДУРЫ

Для колоноскопии или колоноскопии/ЭГДС

12:00–18:00 В ДЕНЬ НАКАНУНЕ ПРОЦЕДУРЫ: 1-Я ЧАСТЬ ПЕРВОЙ ДОЗЫ



ШАГ 1

Примите 2 таблетки слабительного «бисакодил» (bisacodyl) по 5 мг, запив их стаканом (240 мл/8 oz) воды или прозрачной жидкости.

ЧЕРЕЗ ЧАС: 2-Я ЧАСТЬ ПЕРВОЙ ДОЗЫ



ШАГ 1

Смешайте бутылку MiraLAX с 1920 мл (64 oz) прозрачной жидкости, такой как Gatorade или G2, в большом кувшине.



ШАГ 2

Выпивайте по стакану (240 мл/8 oz) раствора каждые 15–30 минут, пока не выпьете весь.

- 240 мл (8 oz.) 240 мл (8 oz.)
 240 мл (8 oz.) 240 мл (8 oz.)
 240 мл (8 oz.) 240 мл (8 oz.)
 240 мл (8 oz.) 240 мл (8 oz.)

ЗА ПЯТЬ (5) ЧАСОВ ДО ПРОЦЕДУРЫ: ВТОРАЯ ДОЗА



ШАГ 1

Примите 2 таблетки слабительного «бисакодил» (bisacodyl) по 5 мг, запив их стаканом (240 мл/8 oz) воды или прозрачной жидкости.



ШАГ 2

Растворите пакет цитрата магния в 300 мл (10 oz) воды комнатной температуры. Перемешайте до растворения и выпейте.



ШАГ 3

Выпейте не менее двух стаканов воды или прозрачной жидкости по 240 мл (8 oz).



- Вы должны закончить за 3 часа до начала процедуры
- За 3 часа до процедуры запрещается пить или есть что-либо. Ниже приведены исключения для лекарств.

ЕСЛИ ВЫ В ТЕЧЕНИЕ ЭТИХ 3 ЧАСОВ ЧТО-ЛИБО ВЫПЬТЕ, ПРОЦЕДУРА МОЖЕТ БЫТЬ ОТЛОЖЕНА ИЛИ ОТМЕНЕНА.

ЛЕКАРСТВА

Некоторые лекарства, как например те которые для разжижения крови, для диабета, или для потери веса, включая Ozempic, Wegovy, Mounjaro, итд., иногда надо временно остановить перед вашей процедурой. Спросите об этом вашего врача.

373RV10Q12025