



**CAPITAL
DIGESTIVE
CARE**SM

First in Digestive Health

PREPARACIÓN DE SUFLAVE - CON DIETA DE LÍQUIDOS CLAROS PLANIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y HOJA DE CONSEJOS

(SUFLAVE PREP WITH CLEAR LIQUID DIET PROCEDURE
PLANNING & TIP SHEET)

INFORMACIÓN PERTINENTE DE SU PROCEDIMIENTO

(YOUR PERTINENT PROCEDURE INFORMATION)

Fecha del procedimiento: _____ **Hora del procedimiento:** _____ **Hora de llegada:** _____
(Procedure date) (Procedure time) (Arrival time)

Nombre del lugar de la cita: _____
(Appointment location name)

Dirección del lugar de la cita: _____
(Appointment location address)

**Nombre de la persona
a cargo del regreso a casa:** _____ **Parentesco:** _____
(Name of person providing you a ride home) (Relationship)

Número de teléfono: _____
(Phone number)

OTRAS INSTRUCCIONES

- Traiga su identificación con fotografía y sus tarjetas de seguro y copago, si es necesario.
- Use ropa cómoda. No use joyas ni traiga objetos de valor.
- No use perfume ni lociones. Se permite el uso de desodorante.

FORMAS DE FACILITAR LA PREPARACIÓN

- Los pacientes pueden usar Desitin, Anusol, almohadillas Tucks o vaselina para cubrir la zona rectal y evitar que se irrite durante la preparación.
- Los pacientes pueden beber la solución de preparación con un sorbete o taparse la nariz al beberla.
- Los pacientes deben espaciar las dosis si sienten náuseas.
- Los pacientes que vomiten la preparación deberán hacer una pausa y seguir bebiéndola de a poco una vez que hayan pasado los vómitos.

QUÉ ESPERAR

- Puede esperar tener deposiciones frecuentes y diarrea en 1 a 4 horas. Tenga paciencia y trate de caminar para estimular la motilidad intestinal. Permanezca cerca de un baño. Durante este tiempo, continúe con la preparación.
- Espere eliminar un líquido claro o amarillo al finalizar la preparación.
- Debe completar todas las dosis de la preparación, incluso si elimina un líquido claro o amarillo al principio del proceso.
- Los pacientes deben seguir bebiendo líquidos claros hasta 3 horas antes del procedimiento. Durante las 3 horas previas al procedimiento, no consuma nada por vía oral, ni siquiera agua, goma de mascar o dulces.
- El procedimiento puede cancelarse en las siguientes circunstancias: si usted no completa la preparación o la preparación es inadecuada (no elimina un líquido claro o amarillo) o si consume productos por vía oral dentro de las 3 horas previas al procedimiento.

PREPARACIÓN DE SUFLAVE - CON DIETA DE LÍQUIDOS CLAROS

INFORMACIÓN PREVIA AL PROCEDIMIENTO | UNA SEMANA ANTES

Para colonoscopia o colonoscopia/esofagogastroduodenoscopia (EGD)

REVISE LO SIGUIENTE 1 SEMANA ANTES DEL PROCEDIMIENTO



LUGAR

Capital Digestive Care (CDC) tiene muchos consultorios y centros de endoscopia locales. Algunas de nuestras sedes están muy cerca entre ellas.

- Se les puede pedir a los pacientes del centro de endoscopia que lleguen entre 45 y 60 minutos antes para completar las actividades de admisión.
- Se les puede pedir a los pacientes hospitalarios que lleguen 1 o 2 horas antes para completar las actividades de admisión.

Revise los avisos de recordatorio de su cita para saber la hora exacta de llegada.



MEDICAMENTOS

Hable con el médico sobre cualquier medicamento o suplemento que tome habitualmente. No suspenda ningún medicamento recetado a menos que se lo indique el médico.



TRANSPORTE

Algunas actividades, como conducir, no están permitidas hasta el día después del procedimiento. Organice su traslado con alguien que pueda asumir la responsabilidad de su cuidado (mayor de 18 años). Pídale que estacione e ingrese a las instalaciones para acompañarlo fuera del edificio. Esta persona debe llegar a más tardar 1 hora después del horario del procedimiento. Si su cita es después de las 3:00 p. m., su acompañante debe llegar a más tardar a las 4:30 p. m. No se permiten servicios de transporte como Uber, Lyft, taxi, etc.



CANCELACIÓN

Nuestro consultorio requiere que se notifique la cancelación en el plazo de una (1) semana; de lo contrario, se aplicará una multa de \$150.

PREPARACIÓN DE SUFLAVE - CON DIETA DE LÍQUIDOS CLAROS

INFORMACIÓN PREVIA AL PROCEDIMIENTO | UNA SEMANA ANTES

Para colonoscopia o colonoscopia/esofagogastroduodenoscopia (EGD)



5 DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO

FARMACIA

Recoja los siguientes suministros:

- Su receta de solución de preparación en la farmacia.
- Si lo desea, puede comprar productos de venta libre para aliviar la irritación rectal, que puede suceder durante la preparación. Algunos ejemplos de estos productos son Desitin, Anusol, las almohadillas Tucks o vaselina.
- Si lo desea, puede mezclar su preparación con líquidos claros que no sean agua, como refrescos claros (p. ej., Sprite, refresco de jengibre) o limonada sin pulpa, para facilitar la preparación.

NO PERMITIDO

- Si toma suplementos de hierro, suspenda su uso hasta después del procedimiento.
- Si toma fentermina, suspenda su uso hasta después del procedimiento.



3 DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO

Modifique la dieta



Deje de comer alimentos ricos en fibra, como semillas, quinoa, frutos secos, frijoles, maíz/palomitas de maíz, frutas crudas, verduras crudas y salvado. Revise la “Planificación previa al procedimiento” y la “Hoja de consejos” para saber qué esperar y los consejos para facilitar la preparación.



1 DÍA ANTES DEL PROCEDIMIENTO

Esta preparación requiere que siga una dieta con líquidos claros desde que se despierta el día antes del procedimiento. Siga las instrucciones sobre cuándo comenzar y cuándo suspender la preparación. **Por motivos de seguridad, se puede cancelar el procedimiento si no se siguen las instrucciones.**

CONSUMIR SOLO LÍQUIDOS CLAROS

Después de despertarse, es importante que beba tantos líquidos claros como pueda a lo largo del día para evitar la deshidratación durante la preparación nocturna.

PERMITIDO*

- Agua, jugo de manzana, jugo de uva blanca y arándano blanco, caldo, té, café (sin leche, crema o sustitutos).
- Gelatina, helados italianos, paletas, refrescos, Kool-Aid, Gatorade.

* Ninguno de estos puede ser de color rojo, naranja o morado, ni puede contener pulpa de fruta.

NO PERMITIDO

- Líquidos o productos de color rojo, naranja o morado.
- Leche, crema o sustitutos no lácteos (como crema artificial o leche de soja o de frutos secos).
- Jugos que contengan pulpa (p. ej., naranja, pomelo, piña, tomate y jugo V-8) o productos de jugo congelado que contengan pulpa.
- Bebidas alcohólicas.
- Alimentos sólidos.

PREPARACIÓN DE SUFLAVE - CON DIETA DE LÍQUIDOS CLAROS

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN | TARDE/NOCHE ANTERIOR

Para colonoscopia o colonoscopia/esofagogastroduodenoscopia (EGD)

DE 4 A 6 P. M. EL DÍA ANTES DEL PROCEDIMIENTO: PRIMERA DOSIS

NO SIGA LAS INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN DE LA CAJA DE SUFLAVE

En su lugar, siga las instrucciones a continuación:



PASO 1

Abra 1 paquete para mejorar el sabor y vierta el contenido en 1 frasco.



PASO 2

Llene el frasco provisto con agua tibia hasta la línea de llenado. Después de tapar el frasco, agítelo suavemente hasta que todo el polvo se haya mezclado bien (se disuelva). Para obtener el mejor sabor, refrigere la solución durante una hora antes de beberla. No la congele. Consuma la preparación dentro de las 24 horas.



PASO 3

Beba 8 onzas de solución cada 15 minutos hasta que el frasco esté vacío.



PASO 4

Beba 16 onzas adicionales de agua durante la noche.

CINCO (5) HORAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO: SEGUNDA DOSIS



PASO 1

Abra 1 paquete para mejorar el sabor y vierta el contenido en 1 frasco.



PASO 2

Llene el frasco provisto con agua tibia hasta la línea de llenado. Después de tapar el frasco, agítelo suavemente hasta que todo el polvo se haya mezclado bien (se disuelva). Para obtener el mejor sabor, refrigere la solución durante una hora antes de beberla. No la congele. Consuma la preparación dentro de las 24 horas.



PASO 3

Beba 8 onzas de solución cada 15 minutos hasta que el frasco esté vacío.



PASO 4

Beba 16 onzas adicionales de agua durante la noche.



- Debe terminar de beber 3 horas antes de la hora del procedimiento.
- No consuma nada por vía oral 3 horas antes de la hora del procedimiento. Vea a continuación las excepciones relativas a los medicamentos.

SI BEBE DENTRO DE ESTE PLAZO DE 3 HORAS, PUEDE QUE SE CANCELE O APLACE EL PROCEDIMIENTO.

MEDICAMENTOS

- Tome sus medicamentos como la aspirina, presión arterial, Parkinson, convulsiones o medicamentos de asma . Tome estos medicamentos 3 o más horas antes de la hora de inicio del procedimiento con sólo un pequeño sorbo de agua.
- Si un médico le ha recetado un inhalador para el asma, tráigalo al procedimiento.
- Algunos medicamentos como anticoagulantes, ciertos medicamentos para la diabetes o para bajar de peso, incluyendo inyecciones: GLP-1, Ozempic, Wegovy, y otros medicamentos para bajar de peso, pueden suspenderse temporalmente antes del procedimiento.

370Q12025